

Ueber den Einfluß von
Adrenalin, Ephedrin, Sympatol
und Corbasil auf die Sauerstoff-
zehrung überlebender Gewebe.

Dr. Josef Buczek.

Aus dem Pharmakologischen Institut der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Westf.
Direktor: Prof. Dr. med. et. phil. H. Freund

Ueber den Einfluß von Adrenalin, Ephedrin, Sympatol und Corbasil auf die Sauerstoffzehrung überlebender Gewebe.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der zahnmedizinischen Doktorwürde der
Hohen Medizinischen Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Westf.

vorgelegt von

Josef Buczek
Zahnarzt
Straelen 1935.

Dekan: Prof. Dr. K. W. Jötten

Referent: Privatdozent Dr. med. et phil. W. Haarmann

Korreferent: Prof. Dr. med. et phil. H. Freund



Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Westf.

Als Belavenez¹⁾ im Jahre 1903 nachwies, daß der Gasstoffwechsel von Warmblütern nach Adrenalininjektionen gesteigert wurde, fanden seine Ergebnisse durch zahlreiche Nachuntersuchungen ihre Bestätigung. Es entwickelte sich die große Aufgabe, die Oxydationsprozesse im Körper an ihren einzelnen Quellen zu erfassen und den Organstoffwechsel in seine Komponente zu zerlegen. Schon gleich nach den ersten Versuchen am tierischen Gesamtorganismus glaubte man, die Ursache der gesteigerten Wärmebildung, die auch nach Freund²⁾ zu aseptischem Fieber führen kann, gefunden zu haben. Man machte ein Erregung des Sympathicus — dadurch bedingt eine Tonussteigerung bezw. Kohlenhydratausschüttung — für diese Wirkung verantwortlich. Erst die Versuchsergebnisse von Boothby und Sandifort³⁾ brachten immer mehr die Hypothese von einer primären Stoffwechselstimulation der Zellen zur Geltung. Sie sprechen von einer Erhöhung des „gesamten vitalen Tonus“ durch eine „spezifisch-dynamische Wirkung“ des Adrenalins. Heftige Angriffe erfolgten und bald platzten die Theorien der einzelnen Autoren aufeinander.

Da aber für die Beurteilung des Eigenstoffwechsels des Gewebes die Untersuchungen am tierischen Gesamtorganismus keine verlässlichen Anhaltspunkte ergaben, wurde ein anderer Weg zum Erfolg beschritten. Unbelastet von mehreren dirigierenden Faktoren sollte die reine Gewebsatmung der einzelnen Organe bei Adrenalinzusatz festgestellt werden. Man verließ den Gesamtorganismus und schaltete somit einige Komponenten der Organatmung, wie Nerven- und Inkretinflüsse, oftmals sogar starke Änderungen des physikalisch-chemischen Milieus, aus. Die Versuche wurden am überlebenden Gewebe fortgesetzt. Hier aber bringt die nachfolgende Literatur die widersprechendsten Angaben über derartige Versuchsergebnisse.

¹⁾ Belavenez: zit. n. Ahlgren: Skand. Arch. f. Physiol. 47, 205, 1925, Suppl.

²⁾ Freund, H.: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 65, 235, 1911.

³⁾ Boothby und Sandifort: Amer. Journ. of Physiol. 66, 93, 1923.

Hutchinson¹⁾ und Griffith²⁾ stellten Versuche mit ganzen enthäuteten Froschhinterbeinen in Ringerlösung an. Sie konnten bei Anwendung der indirekten Sauerstoffbestimmungsmethode eine Steigerung des CO₂-Umsatzes nicht feststellen. Bei Anwendung der Dinitrobenzolmethode gelang es Adler und Lipschitz³⁾ an fein verteilter Froschmuskulatur eine deutliche Beschleunigung der Entfärbung festzustellen. Denselben Erfolg hatte auch Ahlgren⁴⁾ mit Methylenblau als Wasserstoffakzeptor. In einer großen Anzahl von Versuchen mit Froschmuskulatur konnte der kalorogene Adrenalin-effekt beinahe konstant nachgewiesen werden. Ahlgren fand die stärkste Verkürzung der Entfärbungszeit bei einer Konzentration von 10⁻¹¹-10⁻¹². Die Steigerung betrug zwischen 25 und 60%. Hemmungswirkungen traten erst bei einer Konzentration von 10⁻⁶ auf. Nach Starke⁵⁾ beeinflussen die dem Adrenalin chemisch und pharmakologisch nahestehenden Verbindungen Sympatol, Corbasil und Ephedrin die Dehydrierungsvorgänge im Gewebe stark. In der Konzentration 10⁻⁸ wird die Entfärbungszeit erheblich verkürzt. In höheren Konzentrationen treten bei einzelnen Dehydrierungsvorgängen Hemmungen auf. Auch bestehen Unterschiede zwischen den einzelnen Geweben in der Empfindlichkeit den Giften gegenüber. So hemmt z. B. das Sympatol im Gegensatz zu den anderen die Dehydrierung in der Leber. Die Versuche von Adler und Ahlgren können nicht als Beweis für eine oxydationssteigernde Wirkung des Adrenalins angesehen werden, da in ihnen nicht der Sauerstoffverbrauch, sondern die Reduktion von körperfremden Farbstoffen gemessen wurde. Nach der Erfahrung des hiesigen Instituts werden die Dehydrierungen und Oxydationen durch Gifte durchaus nicht in der gleichen Richtung beeinflusst. Die Wasserstoffaktivierung, die die Vorbedingung für die eigentliche Oxydation ist, kann beschleunigt verlaufen, während die Sauerstoffaufnahme verzögert ist. Beweisend für gesteigerte Oxydationsvorgänge ist nur ein gesteigerter Sauerstoffverbrauch.

¹⁾ Hutchinson: Amer. Journ. of Physiol. 62, 192, 1922.

²⁾ Griffith: Amer. Journ. of Physiol. 65, 15, 1923.

³⁾ Adler und Lipschitz: Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 95, 181, 1922. zit. n. Ahlgren.

⁴⁾ Ahlgren: Skand. Arch. f. Physiol. 47, 1925, S. 206. Suppl.

⁵⁾ Starke: Inaugural-Dissertation, Münster 1935.

Ellinger¹⁾ und Yamakita²⁾ haben Gänse- und Kaninchenerythrocyten zum Gegenstand ihrer Untersuchungen teils mit, teils ohne Zusatz von Adrenalin gemacht. Konzentrationen von $2 \cdot 10^{-6}$ - $2 \cdot 10^{-4}$ erbrachten Ellinger gar keinen Effekt. Yamakita fand bei einer Konzentration von 10^{-4} sogar kräftige Hemmungen. Beide gingen nach der Warburg'schen Methode vor. Grafe³⁾ hat mit der Gewebsschnittmethode von Warburg keine Atmungssteigerungen durch Adrenalinzufuhr feststellen können.

Den ersten positiven Erfolg erbrachte Ahlgren, der einige Versuche in Thunbergs Mikrorespirometer vornahm. Nach vorheriger Suspension des Muskelbreis in einer Phosphatlösung von ($P_H = \text{ca. } 7$) fand er mit Adrenalin 10^{-7} höhere Werte für den Gasaustausch, als wenn der Phosphatlösung kein Adrenalin zugesetzt wurde. Bei Adrenalinzusatz ergab sich eine Steigerung von 18-37%. Die Phosphatlösung enthielt auch einen Glukosezusatz von 0,05%. Ahlgren fand die Atmungssteigerung nicht sehr hoch, glaubte aber bei geänderter Adrenalinkonzentration und Suspensionsflüssigkeit noch bessere Resultate erzielen zu können.

Zu wechselvollen Resultaten kamen Abderhalden und Gellhorn⁴⁾, die ebenfalls nach der Warburg'schen Methode vorgehen. Sie untersuchten d- und l-Adrenalin auf den Sauerstoffverbrauch fein verteilter Muskulatur. Die negativen Ergebnisse mit Ringerlösung führten sie darauf zurück, daß das Adrenalin nicht in das Gewebe eindringen konnte. Erst die Erhöhung der Permeabilität durch Rohrzuckerzusatz erbrachte ihnen positive Resultate.

Reinwein und Singer⁵⁾ in der Grafe'schen Klinik in Würzburg überprüften ihre ersten Versuche von 1925 auf die Sauerstoffzehrung der überlebenden Leberzelle. Der Sauerstoffverbrauch wurde berechnet für 1 mg Trockengewicht und 1 Stunde. Die Adrenalinkonzentrationen stiegen von 10^{-3} - 10^{-13} . Sie ersetzten die früher gebrauchte Rhodesche Lösung durch

¹⁾ Ellinger: Z. f. Physiol. Chem. 119, 11, 1922.

²⁾ Yamakita: Tothou Journ. of exp. Med. 3, 567, 1922. Zit. n. Ahlgren.

³⁾ Grafe: D. m. W. Nr. 16, 1925.

⁴⁾ Abderhalden und Gellhorn: Biochem. Zeitschr. 211, 471, 1929.

⁵⁾ Reinwein und Singer: Biochem. Zeitschr. 197, 154, 1928.

Phosphat. Trotzdem gelang es nicht, einen fördernden Adrenalin-effekt nachzuweisen. Eine Hemmung setzte bei einer Konzentration von 10^{-5} ein.

Negativ blieben auch die Resultate von Paasch und Reinwein¹⁾, die, trotzdem sie die Adrenalinkonzentrationen, das PH wechselten und auch die verschiedensten Suspensionsflüssigkeiten anwandten (Ringerlösung mit Traubenzucker, Phosphatlösung und Traubenzucker), keinen vermehrten Sauerstoffverbrauch nachweisen konnten. Als Ergebnis ihrer Untersuchungen mußten sie eine direkte Anregung des Zellstoffwechsels durch Adrenalin verneinen.

Als Ausgangsmaterial für ihre Versuchsreihe verwandten Kisch und Leibowitz²⁾:

1. Suprarenin Höchst, salzsauer 1:1000 mit 0,4% Acetonchloroformzusatz,
2. reines Suprareninum bitartaricum syntheticum, krist., Höchst.

Die Ergebnisse blieben bei beiden Ausgangsmaterialien gleich. Die Gewebsart war bei allen Versuchen Niere vom Meerschweinchen, Ratten, Katzen und Hunden, die Versuchsmethode nach Warburg. Weder hohe noch geringe Adrenalinkonzentrationen ergaben einen positiven Effekt auf die Atmung des Gewebes. Auch Rotschild³⁾ fand Adrenalin in Konzentrationen von 10^{-4} - 10^{-9} mit und ohne Glukose in Phosphatpufferlösungen unwirksam. Als Untersuchungsmaterial diente ihm Kaltblütermuskulatur. Er führt die entgegengesetzten Ergebnisse von Ahlgren auf unzureichende Sauerstoffversorgung der Muskulatur und dadurch bedingte Unregelmäßigkeiten zurück. In jüngster Zeit untersuchten Walthard und Wattenwyl⁴⁾ die Beeinflussung der Gewebsatmung von Lebergewebe durch Adrenalin. Adrenalin übt in den untersuchten Konzentrationen von ca. 10^{-4} und 10^{-5} in Ringerlösung keinen Einfluß auf die Atmungsgröße der Leber aus.

¹⁾ Paasch und Reinwein: Biochem. Zeitschr. 211, 469, 1929.

²⁾ Kisch und Leibowitz: Biochem. Zeitschr. 202, 97, 1930.

³⁾ Rotschild: Biochem. Zeitschr. 217, 365, 1930.

⁴⁾ Walthard und Wattenwyl: Ebenda 264, 104, 1933.

Ueberblicken wir die im Schrifttum vorliegenden Untersuchungsergebnisse über den Einfluß des Adrenalins auf den Sauerstoffverbrauch überlebender Gewebe, so sehen wir, daß die Theorie der direkten Einwirkung des Adrenalins auf die Oxydationsvorgänge durchaus unbewiesen ist. Für diese Annahme sprechen nur die Versuche von Ahlgren und bedingt die Ergebnisse von Abderhalden und Gellhorn. Die Mehrzahl der Autoren verneinen also den positiven Adrenalineffekt auf isoliertes Gewebe. Die Ursache ihrer negativen Ergebnisse liegt wohl darin begründet, daß sie mit ihren Adrenalinverdünnungen nicht weit genug gegangen waren. Es sei hier ganz besonders darauf hingewiesen, daß dieselben Autoren (Ellinger, Grafe, Reinwein und Singer, Paasch und Reinwein, Rotschild, Abderhalden) auch den Einfluß von Thyroxin auf die Gewebsatmung verfolgten und in keinem Falle eine Steigerung des Sauerstoffverbrauchs feststellen konnten, obgleich eine Steigerung des Grundumsatzes vom Gesamttier durch Thyroxingaben jedem Mediziner geläufig ist. Die Ursache des Mißerfolgs dieser Autoren ist nach Untersuchungen von Haarmann¹⁾ darauf zurückzuführen, daß den Versuchen zu hohe Thyroxinkonzentrationen zugeführt wurden, wie sie unter physiologischen Bedingungen niemals auftreten können. Hohe Thyroxinkonzentrationen hemmen den Sauerstoffverbrauch und niedrige steigern ihn maximal bei einer Verdünnung von 10^{-15} . Eine Hemmung durch hohe AdrenalinKonzentrationen wurde von einer Reihe von Autoren festgestellt, ohne daß über den Mechanismus dieser Hemmungswirkungen irgendwelche Rückschlüsse gezogen wurden. Da sich an zahlreichen Beispielen zeigen läßt, daß Gifte in hohen Konzentrationen fermentative Vorgänge in umgekehrter Richtung beeinflussen wie in starken Verdünnungen, war damit zu rechnen, daß das gleiche Verhalten auch für Adrenalin zutreffen würde, zumal die Versuche am Gesamttier zu dieser Annahme herausfordern.


Es war daher die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die Frage der Adrenalineinwirkung auf den Sauerstoffverbrauch überlebender Gewebe einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Die Versuche wurden mit der Warburg'schen Apparatur aus-

¹⁾ W. Haarmann: Biochem. Zeitschr. 285, 167, 1936.

geführt. Suspensionsflüssigkeit war Phosphatpufferlösung $\text{pH}=7,36$, $m/30$, Versuchstemperatur 30°C .

Neben dem Adrenalin wurde der Einfluß einer Reihe von sogenannten Adrenalinersatzmitteln, besser noch adrenalin-ähnlichen Mitteln auf die Sauerstoffzehrung untersucht. Allen gemeinsam ist die starke Steigerung des Blutdruckes. Im Gegensatz zum Adrenalin sind das Ephedrin und Sympatol chemisch recht stabile Stoffe, die sogar innerlich verabreicht werden können. Das Corbasil wird als Zusatz zu lokalanaesthesierenden Lösungen wie Novocain verwendet, weil es — nicht wie Adrenalin — weniger häufig unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft.

Die chemischen Beziehungen sind aus folgenden Konstitutionsformeln ersichtlich:



Wie aus den Formeln zu ersehen, ist Adrenalin, das mit Suprarenin, Paranephrin, Epinephrin und Epirenan identisch ist, Dioxyphenyläthanolamin; Ephedrin = Ephetonin = Phenylmethylaminopropanol; Sympatol = Paraoxyphenyläthanolmethylamin und Corbasil = Orthodioxyphenylpropanolamin. Das Ephedrin ist mithin ein Abkömmling des Benzols, das Sympatol des Phenols, das Adrenalin und das Corbasil des Brenzkatechins. Die im Handel befindlichen Verbindungen sind salzsaure Salze der im Wasser unlöslichen Alkaloidbasen. Das Corbasil als Brenzkatechinderivat ist wie Adrenalin gegen Alkali sehr empfindlich.

Untersucht wurden 1. Suprareninum basicum, Höchst, das durch Zusatz von verdünnter Salzsäure in Lösung ge-

bracht wurde. Die im Handel befindlichen Suprareninlösungen enthalten als Desinfektionsmittel 0,4% Acetonchloroform, sodaß unter Umständen bei Verwendungen dieser Lösungen nicht der Adrenalineffekt, sondern die Wirkung des Desinfektionsmittels zur Beobachtung kommen könnte. 2. Ehpedrin, 3. Sympatol und 4. Corbasil. Die Stammlösung wurde aus festem Corbasilpulver und nicht aus der im Handel befindlichen Lösung hergestellt.

Versuchsergebnisse.

Untersucht wurde zunächst der Einfluß der sympathicomimetischen Mittel auf die Sauerstoffaufnahme von Skelettmuskel, Herzmuskel, Hirn und Leber ohne weiteren Zusatz von Nährstoffen (Tabelle 1–4), ferner nach Zusatz von Glukose auf die Atmungsgröße von Herzmuskel und Hirn, schließlich nach Zusatz von bernsteinsaurem Natrium von mit Wasser ausgewaschener Skelettmuskulatur. Das Versuchsmaterial stammte in allen Fällen vom Rind. Die Sauerstoffaufnahme ist der Ausdruck der Oxydation entweder der im Gewebe vorhandenen oder der zugesetzten Nährstoffe. Am übersichtlichsten sind die Bedingungen am ausgewaschenen Skelettmuskel, da dieser keinerlei Sauerstoffzehrung zeigt. Setzt man ihm bernsteinsaures Natrium zu, so tritt eine kräftige Sauerstoffzehrung ein, die ausschließlich durch Verbrennung der Bernsteinsäure bedingt ist.

Nachstehende Tabellen 1–8 bringen die Versuchsergebnisse. Aus ihnen geht hervor, daß das Adrenalin und seine Verwandten die Sauerstoffzehrung am überlebenden Gewebe steigern. Das Optimum der Adrenalinwirkung liegt zumeist bei der Konzentration 10^{-7} , einer Konzentration, die auch Ahlgren zu seinen Versuchen anwandte. Die maximalen Steigerungen betragen bei unseren Versuchen 31% (Tab. 2). Unsere Versuche stimmen mit den Ergebnissen von Ahlgren weitgehend überein. Keine Steigerung durch Adrenalin finden wir im Skelettmuskelversuch nach Glukosezusatz in Uebereinstimmung mit einer Reihe von eingangs genannter Autoren, die gleichfalls die Sauerstoffzehrung in glukosehaltiger Lösung

bestimmten. Eine Hemmung der Sauerstoffaufnahme durch hohe AdrenalinKonzentrationen 10^{-4} findet sich gleichfalls in unseren Versuchen, wenn auch nicht regelmäßig. Adrenalin 10^{-4} hemmt die Sauerstoffaufnahme vom Hirngewebe um 15% (Tab. 3). In starken Verdünnungen 10^{-10} ist keine Förderung der Sauerstoffaufnahme feststellbar.

Die adrenalinähnlichen Mittel wirken im Prinzip wie das Adrenalin. Auch sie fördern in mittleren Konzentrationen 10^{-7} und 10^{-6} die Sauerstoffaufnahme besonders stark. In höheren Konzentrationen setzt auch hier besonders durch Corbasil im Hirngewebe (Tab. 3 und 6) eine stärkere Hemmung der Sauerstoffaufnahme ein. Die Verwandten des Adrenalins erweisen sich in ihrer oxydationssteigernden Wirkung dem Adrenalin mitunter sogar als überlegen. Das gilt besonders für den nächsten Verwandten, das Corbasil, das die Sauerstoffaufnahme von Lebergewebe und Skelettmuskelgewebe erheblich stärker anregt als Adrenalin selbst. Alle näheren Einzelheiten sind aus den Tabellen zu ersehen.

Tabelle 1.
Skelettmuskel, ohne Zusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adre- nalin	Ephe- drin	Sym- patol	Cor- basil	Adre- nalin	Ephe- drin	Sym- patol	Cor- basil
Kontrolle	288	426	231	308	100	100	100	100
1.10 ⁻¹⁰	290	—	—	—	100	—	—	—
1.10 ⁻⁹	319	416	234	314	111	98	101	102
1.10 ⁻⁸	305	428	226	314	106	100	98	102
1.10 ⁻⁷	308	458	241	382	107	107	104	124
1.10 ⁻⁶	299	452	234	354	104	106	101	115
1.10 ⁻⁵	281	460	256	327	98	108	111	106
1.10 ⁻⁴	—	432	236	321	—	101	102	104

Tabelle 2.
Herzmuskel, ohne Zusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adre- nalin	Ephe- drin	Sym- patol	Cor- basil	Adre- nalin	Ephe- drin	Sym- patol	Cor- basil
Kontrolle	243	434	310	348	100	100	100	100
1.10 ⁻¹⁰	244	—	—	—	100	—	—	—
1.10 ⁻⁹	256	438	294	334	105	101	95	96
1.10 ⁻⁸	301	455	302	396	124	105	98	114
1.10 ⁻⁷	328	490	351	433	131	113	113	124
1.10 ⁻⁶	310	526	349	446	128	121	113	128
1.10 ⁻⁵	292	480	334	453	120	111	108	130
1.10 ⁻⁴	—	426	324	446	—	98	104	128

Tabelle 3.
Hirn, ohne Zusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil
Kontrolle	219	124	189	112	100	100	100	100
1.10. ⁻⁹	220	138	223	117	100	111	118	104
1.10. ⁻⁸	242	134	238	117	110	108	126	104
1.10. ⁻⁷	241	146	210	126	110	118	111	112
1.10. ⁻⁶	236	134	207	116	108	108	109	104
1.10. ⁻⁵	227	115	216	92	104	93	114	82
1.10. ⁻⁴	186	132	205	88	85	106	108	78

Tabelle 4.
Leber, ohne Zusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil
Kontrolle	266	152	129	94	100	100	100	100
1.10. ⁻⁹	265	153	131	102	100	101	102	108
1.10. ⁻⁸	294	151	130	146	111	99	101	155
1.10. ⁻⁷	319	158	140	152	120	104	109	162
1.10. ⁻⁶	291	157	135	123	109	104	105	131
1.10. ⁻⁵	277	155	134	111	104	102	104	118
1.10. ⁻⁴	264	140	133	103	100	92	103	110

Tabelle 5.
Herzmuskel, Glukosezusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil
Kontrolle	236	544	448	494	100	100	100	100
1 · 10 ⁻¹⁰	234	—	—	—	99	—	—	—
1 · 10 ⁻⁹	248	548	448	508	105	101	100	103
1 · 10 ⁻⁸	266	548	453	508	113	101	101	103
1 · 10 ⁻⁷	302	552	494	524	128	101	110	106
1 · 10 ⁻⁶	256	568	478	526	108	104	107	106
1 · 10 ⁻⁵	240	572	474	550	101	105	106	111
1 · 10 ⁻⁴	—	528	447	509	—	97	100	103

Tabelle 6.
Hirn, Glukosezusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil	Adrenalin	Ephedrin	Sympatol	Corbasil
Kontrolle	240	249	182	196	100	100	100	100
1 · 10 ⁻⁹	244	252	194	209	102	101	107	107
1 · 10 ⁻⁸	240	252	203	212	100	101	111	108
1 · 10 ⁻⁷	236	282	211	218	98	113	116	111
1 · 10 ⁻⁶	244	276	222	221	102	111	122	113
1 · 10 ⁻⁵	228	272	205	196	95	109	113	100
1 · 10 ⁻⁴	220	263	199	157	92	106	109	80

Tabelle 7.
Skelettmuskel, Bernsteinsäurezusatz.

Konzentration	cmm O ₂				O ₂ : % der Kontrolle			
	Adre- nalin	Ephe- drin	Sym- patol	Cor- basil	Adre- nalin	Ephe- drin	Sym- patol	Cor- basil
Kontrolle	455	528	472	411	100	100	100	100
1.10 ⁻⁹	504	524	470	410	111	99	100	100
1.10 ⁻⁸	588	538	478	436	129	102	101	106
1.10 ⁻⁷	528	542	524	485	116	103	111	118
1.10 ⁻⁶	—	558	510	468	—	106	108	114
1.10 ⁻⁵	452	536	504	464	99	102	107	113
1.10 ⁻⁴	456	528	485	448	100	100	103	109

Tabelle 8.
Skelettmuskel, Glukosezusatz.
Adrenalin.

Konzentration	0,0	1.10 ⁻¹⁰	1.10 ⁻⁹	1.10 ⁻⁸	1.10 ⁻⁷	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁵
cmm O ₂	437	441	449	452	456	456	411
O ₂ : % der Kontrolle	100	101	103	103	104	104	94

Zusammenfassung.

Adrenalin und die ihm ähnlich gebauten Verbindungen Ephedrin, Sympatol und Corbasil steigern die Sauerstoffatmung von überlebendem Gewebe. Das Optimum der Sauerstoffaufnahme liegt bei allen Stoffen annähernd bei der gleichen Konzentration von ca. 10^{-7} . Die maximalen Steigerungen bei unseren Versuchen betragen unter der Adrenalinwirkung bis zu 31%. Die Ausschläge für die übrigen Stoffe sind von der gleichen Größenordnung. Bereits in Konzentrationen von 10^{-5} - 10^{-4} tritt eine Hemmung auf. Die Adrenalinwirkung auf Gasstoffwechsel ist somit durch eine primäre Anregung der Oxydationsvorgänge in der Zelle selbst und nicht sekundär durch einen gesteigerten Erregungszustand des Sympathicus bedingt.

Lebenslauf.

Ich bin am 6. November 1908 zu Königshütte O.S. als Sohn des Schichtmeisters Constantin Buczek und seiner Ehefrau Maria geb. Griese geboren. Die Volksschule besuchte ich in meiner Heimatstadt und in Rheinberg, die höhere Schule in Rheinberg, Straelen und Geldern. In Geldern bestand ich Ostern 1929 meine Reifeprüfung und wandte mich darauf dem Baufach zu. Erst im Wintersemester 1931 begann ich das Studium der Zahnheilkunde auf der Universität zu Münster. Mit Unterbrechung eines Semesters auf der Universität in Wien bestand ich nach 3 Semestern meine zahnärztliche Vorprüfung und nach weiteren 4 Semestern das zahnärztliche Staatsexamen im Frühjahr 1935.

Am Schlusse meiner Arbeit möchte ich nicht versäumen, Herrn Dr. Dr. Walter Haarmann für die Ueberlassung des Themas sowie für manchen wertvollen Hinweis meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

